

NL

FR [cliquez ici](#)

EN [click here](#)



LIPOLYSE (PROSTROLANE INNER-B) - INFORMATIE & TOESTEMMING

Voornaam:	Achternaam:
Adres:	Postcode:
Geboortedatum:	Telefoonnr.:
E-mail;	

PROSTROLANE Inner-B is een steriel medisch hulpmiddel.

Samenstelling:

Dit injecteerbare, biologisch afbreekbare, resorbabeerbare en transparante implantaat bevat een exclusieve formulering, bestaande uit niet-vernet natriumhyaluronaat (7 mg/ml) en een peptidecomplex.

- Vetverwijdering in de adipocyt
- Regulering van lipogenese: Nonapeptide-32, Pentapeptide-43 en Tripeptide-41
- Ontstekingsremmend (Octapeptide-11)

Het ingespoten hyaluronzuur beschermt de peptiden. De peptiden beschermen het hyaluronzuur in het weefsel.

Acties:

- Gerichtte vetreductie, activering van de AMPK-, PKA- en ERK-route die de lipolyse in opgehoopte lipidedruppels sterk verhoogt door fosforylering van ATGL en HSL.
- Vermindering van de adipocyten zonder apoptose
- Vermindering van lipogenese
- Verminderd transport van vrije vetzuren naar mitochondriën, remming van lipogenese en ophoping van triglyceriden in vetcellen. Geen weefselvernietiging.
- Werkt door het verminderen van onregelmatigheden in de huid veroorzaakt door onderliggende vetophoping emulgeert vetcellen om de dikte van het behandelde gebied te verminderen.

Indicaties:

De rol van het peptidecomplex:

- Verbeterd de hydraterende werking.
- Verbeterd de contouren van specifieke delen van de huid door vetophoping te verminderen zonder de noodzaak van meer invasieve cellyse.
- Vertraagt de afbraak van natriumhyaluronaat.

Ik verklaar dat ik op begrijpelijke en duidelijke wijze ben geïnformeerd door dokter:

.....

- over de kenmerken van de voorgestelde behandeling, de verwachte voordelen, de mogelijke gevolgen en de mogelijke risico's, die evenwel als theoretisch en gemeenschappelijk voor elke behandeling met hyaluronzuur-biostimulantia moeten worden beschouwd
- over de bijzondere aandacht en voorschriften die thuis in acht moeten worden genomen om het optreden van complicaties en bijwerkingen niet te bevorderen
- Voorzorgsmaatregelen voorafgaand aan peptide-injecties zijn auto-immuunziekte, zwangerschap, borstvoeding, ernstige allergische voorgeschiedenis of anafylactische shock, gebied behandeld met een ander niet-absorberend product, overgevoeligheid voor HA

In het bijzonder is mij meegedeeld dat:

PROSTROLANE Inner-B kan worden geïnjecteerd in de hypodermis, in het onderhuidse vetweefsel.

- De patiënt moet het gebruik van aspirine, niet-steroïde ontstekingsremmers, sint-janskruid of hoge doses vitamine E-supplementen vermijden, omdat deze middelen blauwe plekken en bloedingen in de behandelde gebieden kunnen veroorzaken.
- Reacties zoals roodheid, zwelling, oedeem, hematoom, jeuk en lichte pijn op de injectieplaatsen kunnen optreden na behandeling met PROSTROLANE Inner-B. Deze reacties verdwijnen gewoonlijk na 72 uur.
- De duur van de behandeling hangt af van de behandelde zone en de gebruikte injectietechniek.
- Injectie van PROSTROLANE Inner-B kan hyperpigmentatie, blauwe plekken of bloedingen op de injectieplaats veroorzaken, die binnen enkele dagen spontaan verdwijnen..
- Op de injectieplaatsen kunnen lichte tot matige ontstekingsreacties optreden, die gewoonlijk binnen enkele dagen verdwijnen..
- Blootstelling van het behandelde gebied aan overmatig zonlicht, blootstelling aan UV-licht en extreme weersomstandigheden moet tot een minimum worden beperkt, totdat de zwelling minimaal is en de roodheid is verdwenen..
- Om de behandeling en het resultaat op lange termijn te optimaliseren, is een reeks sessies noodzakelijk. Periodieke onderhoudssessies garanderen de resultaten volgens de gewenste graad.

Ik bevestig dat ik bewust kennis heb genomen van het bovenstaande, dat ik mijn vragen heb kunnen stellen en de nodige verduidelijkingen heb gekregen.

Om deze redenen stem ik in met de voorgestelde behandeling.

naam + voornaam patiënt	handtekening patiënt	datum
-------------------------	----------------------	-------

LIPOLYSE (PROSTROLANE INNER-B) - INFORMATION & CONSENTEMENT

Prénom :	Nom de famille :
Adresse :	Code postal :
Date de naissance :	téléphone :
E-mail :	

PROSTROLANE Inner-B est un dispositif médical stérile.

Composition :

Cet implant injectable, biodégradable, résorbable et transparent contient une formulation exclusive, composée de hyaluronate de sodium non réticulé (7 mg / ml) et un complexe peptide

- Déstockage des graisses dans l'adipocyte
- Régulation de la lipogenèse : Nonapeptide-32, Pentapeptide-43 et Tripeptide-41
- Anti-inflammatoire (Octapeptide-11)

L'acide hyaluronique injecté protège les peptides. Les peptides vont protéger l'Acide Hyaluronique des tissus.

Actions :

- Réduction ciblée des graisses, activation de la voie AMPK, PKA et ERK qui augmente fortement la lipolyse dans les gouttelettes de lipides accumulés par la phosphorylation d'ATGL et HSL.
- Réduction de la taille des adipocytes sans apoptose
- Réduction de la lipogenèse
- Diminution du transport des acides gras libres dans les mitochondries, inhibition de la lipogenèse et l'accumulation de triglycérides dans les cellules adipeuses. Pas de destruction tissulaire.
- Agit en réduisant les irrégularités de la peau causées par l'accumulation de graisse sous-jacente émulsionne les cellules graisseuses afin de réduire l'épaisseur de la zone traitée.

Indications :

Le rôle du complexe peptidique :

- Améliore l'effet hydratant.
- Améliore les contours des zones spécifiques de la peau en réduisant l'accumulation de graisse sans avoir recours à une lyse cellulaire plus contraignante.
- Retarde la dégradation du hyaluronate de sodium.

Je déclare avoir été informé de manière compréhensible et claire par le docteur :

-
- Sur les caractéristiques du traitement proposé, sur les bénéfices attendus, sur les conséquences éventuelles ainsi que sur les risques potentiels liés, qui doivent cependant être considérés comme théoriques et commun à chaque traitement avec des biostimulants à base d'acide hyaluronique
 - Sur l'attention particulière et sur les prescriptions à observer chez soi pour ne pas favoriser l'apparition de complications et d'effets secondaires
 - Des précautions avant une injection de peptide soit, maladie auto immune, grossesse, allaitement, antécédent allergique grave ou choc anaphylactique, zone traitée par un autre produit non résorbable, hypersensibilité à l'AH

En particulier, j'ai été informé de ce qui suit :

PROSTROLANE Inner-B peut être injecté dans l'hypoderme, dans le tissu adipeux sous cutané.

- Le patient doit éviter de prendre de l'aspirine, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, Millepertuis ou de fortes doses de suppléments de vitamine E car ces agents peuvent augmenter les ecchymoses et les saignements sur les zones de traitement.
- Des réactions telles que rougeur, enflure, oedème, hématome, démangeaison et légère douleur aux zones d'injection peuvent survenir à la suite d'un traitement avec PROSTROLANE Inner-B. Ces réactions régressent généralement après 72 heures.
- La durée du traitement dépend du type de zone traitée et de la technique d'injection utilisé.
- L'injection de PROSTROLANE Inner-B peut provoquer une hyperpigmentation, des ecchymoses ou des saignements au niveau des zones d'injection, qui se résolvent spontanément dans les jours qui suivent.
- Il peut se produire des réactions inflammatoires légères à modérées aux sites d'injection qui généralement se résolvent les jours suivant.
- L'exposition de la zone traitée à une exposition excessive au soleil doit être minimisée, exposition à une lampe UV et des conditions météorologiques extrêmes, jusqu'au retrait au minimum des gonflements et la disparition des rougeurs.
- Pour optimiser le traitement et le résultat dans la durée, il est nécessaire de recourir à une série de sessions. Des séances d'entretien périodiques garantissent les résultats suivant le degré recherché.

Je confirme que j'ai consciemment reconnu ce qui précède, que j'ai pu exprimer mes questions et avoir obtenu les clarifications pertinentes.

Pour ces raisons, je consens au traitement proposé.

nom + prénom patient

signature du patient

date

LIPOLYSIS (PROSTROLANE INNER-B) - INFORMATION & CONSENT

First name:	Last name:
Address:	Postal code:
Date of birth:	Telephone:
E-mail:	

PROSTROLANE Inner-B is a sterile medical device.

Composition:

This injectable, biodegradable, resorbable and transparent implant contains an exclusive formulation, composed of non-cross-linked sodium hyaluronate (7 mg / ml) and a peptide complex

- Fat removal in the adipocyte
- Regulation of lipogenesis: Nonapeptide-32, Pentapeptide-43 and Tripeptide-41
- Anti-inflammatory (Octapeptide-11)

The injected hyaluronic acid protects the peptides. The peptides will protect the Hyaluronic Acid in the tissue.

Actions:

- Targeted fat reduction, activation of the AMPK, PKA and ERK pathway which strongly increases lipolysis in accumulated lipid droplets by phosphorylation of ATGL and HSL.
- Reduction in adipocyte size without apoptosis
- Reduction of lipogenesis
- Decreased transport of free fatty acids into mitochondria, inhibition of lipogenesis and triglyceride accumulation in fat cells. No tissue destruction.
- Works by reducing skin irregularities caused by underlying fat accumulation emulsifies fat cells to reduce the thickness of the treated area.

Indications:

The role of the peptide complex:

- Improves the moisturising effect.
- Improves the contours of specific areas of the skin by reducing fat accumulation without the need for more invasive cell lysis.
- Delays the degradation of sodium hyaluronate.

I declare that I have been informed in a comprehensible and clear manner by the doctor :

-
- On the characteristics of the proposed treatment, on the expected benefits, on the possible consequences as well as on the potential risks involved, which must however be considered as theoretical and common to each treatment with hyaluronic acid-based biostimulants
 - On the particular attention and prescriptions to be observed at home in order not to favour the appearance of complications and side effects
 - Precautions before a peptide injection are: autoimmune disease, pregnancy, breastfeeding, severe allergic history or anaphylactic shock, area treated with another non-resorbable product, hypersensitivity to HA

In particular, I have been informed of the following:

PROSTROLANE Inner-B can be injected into the hypodermis, into the subcutaneous fatty tissue.

- The patient should avoid taking aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs, St. John’s Wort or high doses of vitamin E supplements as these agents may increase bruising and bleeding in the treatment areas.
- Reactions such as redness, swelling, edema, hematoma, itching and mild pain at the injection sites may occur following treatment with PROSTROLANE Inner-B. These reactions usually subside after 72 hours.
- The duration of the treatment depends on the type of area treated and the injection technique used.
- Injection of PROSTROLANE Inner-B may cause hyperpigmentation, bruising or bleeding at the injection site, which resolves spontaneously within a few days.
- Mild to moderate inflammatory reactions may occur at the injection sites, which usually resolve within a few days.
- Exposure of the treated area to excessive sunlight should be minimised, exposure to a UV lamp and extreme weather conditions, until swelling is minimised and redness has disappeared.
- In order to optimise the treatment and the result in the long term, it is necessary to have a series of sessions. Periodic maintenance sessions guarantee the results according to the degree sought.

I confirm that I have consciously acknowledged the above, that I have been able to express my questions and have obtained the relevant clarifications.

For these reasons, I consent to the proposed treatment.

name + first name patient	signature patient	date
